



¿Conoce la diferencia entre la gripe intestinal y la gripe común?



«Gripe intestinal» es un término popular y no el verdadero diagnóstico médico. El término médico apropiado para la gripe intestinal es gastroenteritis. A menudo la gente confunde los síntomas de la gripe intestinal o gastroenteritis con los de la infección viral comúnmente conocida como «gripe», que son: fiebre, congestión nasal, dolor muscular y fatiga. Aprenda más sobre la gripe intestinal y la influenza para poder identificar los síntomas de la gripe y recibir el tratamiento adecuado.

Gripe vs. resfriado vs. «gripe» intestinal			
	Gripe estacional	Resfriado	«Gripe» intestinal
	Es provocada por los virus de influenza A y B	Muchos tipos diferentes de virus, como rinovirus, coronavirus, adenovirus, entre otros. NO ES PROVOCADO POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA	El norovirus (o virus de tipo Norwalk) es el más común; sin embargo, el malestar estomacal responde a diversas causas. NO ES PROVOCADO POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA
Prevención	La vacuna anual contra la gripe lo protege de las cepas de influenza que circulan esa temporada	No se puede prevenir con una vacuna	No se puede prevenir con una vacuna
Afecta a todo el cuerpo	Generalmente	Nunca	Nunca
Los síntomas se manifiestan rápidamente	Sí	No. Los síntomas aparecen gradualmente	Sí
Dolor de cabeza	Sí, y puede ser fuerte	Casi nunca	A veces
Escalofríos, molestias, dolor	Sí, a menudo fuertes	Casi nunca	Habitualmente
Cansancio extremo	Sí, puede durar de dos a tres semanas o más	Casi nunca	A veces
Fiebre	Sí. Es común la fiebre alta, que comienza repentinamente y dura de tres a cuatro días	A veces	Casi nunca
Tos	Generalmente	A veces	Casi nunca