



La vacuna contra el VPH protege contra SEIS tipos de cáncer

Cáncer de boca y garganta

No existe ninguna prueba de tamizaje. El primer síntoma suele ser un abultamiento en el cuello. Pida a su dentista que busque por cualquier signo de estos tipos de cáncer.


Cáncer cervical

El cáncer cervical es el único tipo de cáncer causado por el VPH que puede ser detectado en etapas tempranas con una prueba de tamizaje.

Otros CUATRO tipos de cáncer pueden ser causados por el VPH

Estos tipos de cáncer no pueden ser detectados en etapas tempranas con una prueba de tamizaje. Generalmente son encontrados en etapas tardías, causando problemas muy serios o incluso la muerte.

LOS CASOS DE CÁNCER CAUSADOS POR EL VPH CADA AÑO EN LOS EE.UU. ^{1,2}



La vacuna del VPH es segura y efectiva y puede prevenir hasta en un 90% esos tipos de cáncer.



El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda la vacuna del VPH para **TODOS** los adolescentes comenzando a la edad de 11 o 12 años. Puede aplicarse a partir de los 9 años y hasta los 45 años de edad.



**INDIANA
IMMUNIZATION
COALITION**

vaccinateindiana.org

1. <https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm>
2. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6815a1.htm>